

Biscutum BLACK emend. REINHARDT, 1966

Description:

Diagnose: Zwei circuläre, verschieden grosse konkav-konvexe Disken stehen aufeinander. Sie rahmen eine zentrale Bohrung ein, deren Basis ein Septum aus Granulae verschliesst.

Remarks:

Unterschiede: *Cribrosphaerella* DEFLANDRE, 1952 hat eine elliptische Kontur. Circuläre Scheiben mit einer zentralen Durchbohrung und einer basalen Hervorragung, aber ohne granulates zentrales Septum bleiben *Tiarolithus* KAMPTNER, 1958 vorbehalten.

Bemerkung: Black (1959) betont das Fehlen einer zentralen Pore. Sie wird durch ein Septum verschlossen, dessen granulaten Charakter der Verfasser als ein taxionomisch wichtiges Merkmal ansieht.

Type species:

Biscutum testudinarium BLACK, 1959.

Author:

Reinhardt P., 1966, p. 30.

Reference:

Zur Taxionomie und Biostratigraphie des fossilen Nannoplanktons aus dem Malm, der Kreide und dem Alttertiär Mitteleuropas. Freiburger Forschungshefte, C196 Paläont., pp. 5-109, pls. 1-23, text-figs. 1-29.