


Marthasterites furcatus bramlettei DEFLANDRE, 1959



2

FIG. 2 — *Marthasterites furcatus* (DEFL.) var.
bramlettei n. v. Holotype. BZ 24. Santonien,
marne de Bonham, Detroit, Texas, U.S.A.
x 3200.

Description:

Diffère du type par le nombre des lobes situés à l'extrémité des bras, ici au nombre de trois, avec parfois l'indication d'un quatrième. Lobes bien fourchus, avec de courtes épines.

Dimensions: 10—11 μ .

Remarks:

La structure de cette variété, nettement plus complexe que celle du type, fait-elle partie des possibilités de l'espèce, ou s'agit-il d'une forme nettement détachée, je ne saurais encore le dire. Mais ne l'ayant pas trouvée en France, j'ai jugé utile de la nommer, au moins pour attirer l'attention sur elle.

Type level:

Santonien.

Type locality:

Marne de Bonham, Detroit, Texas, U.S.A.

Depository:

Collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'École pratique des Hautes Études, Paris.
Holotype: BZ 24.

Author:

Deflandre G., 1959, p. 139; pl. 3, fig. 2.

Reference:

Sur les Nannofossiles calcaires et leur systématique. Rev. Micropaléont., vol. 2, n° 3, pp. 127-152, pls. 1-4.