


Parhabdolithus marthae DEFLANDRE, 1954



FIGS. 22, 23 — *Parhabdolithus marthae* DEFL. Holotype: AP 76. x 2700 env. Marne oxfordienne de Villers-sur-Mer (Calvados). Fig. 23 en lumière polarisée, nicols croisés.
FIGS. 101, 102 — *Parhabdolithus marthae* DEFL. (Oxford., Villers) AP 76. x 3600.
FIG. 103 — *P. cf. marthae* DEFL. (Oxford., Villers) AP 76.

Description:

Cuvette basale à fond peu ou pas relevé portant une robuste hampe, d'un diamètre initial dépassant le tiers de la longueur de la cuvette; hampe conique courte, ou plus développée, mais ne dépassant guère le double de la hauteur de la cuvette, avec un canal axial bien net. (Holotype: haut. 10 μ ; embase: long. 5,7 μ . Autres spécimens: haut. 5,5—7,8 μ ; embase: long. 5,8—6 μ ; larg. 4,2 μ).

Remarks:

Forme d'aspect assez variable quant au développement de la hampe, mais toujours plus robuste que *P. liasicus*.

Type level:

Oxfordien.

Type locality:

Villers-sur-Mer, Calvados (Spain).

Depository:

Collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'École pratique des Hautes Études, Paris.
Holotype: AP 76.

Author:

Deflandre G. in Deflandre G. and Fert Ch., 1954, p. 163; pl. 15, figs. 22, 23; text-figs. 101, 102, 103.

Reference:

Observations sur les Coccolithophoridés actuels et fossiles en microscopie ordinaire et électronique. Ann. Paléont., vol. 40, pp. 115-176, pls. 1-15, text-figs. 1-127.