

Scyphosphaera ampla KAMPTNER, 1955



FIG. 118 — *Scyphosphaera ampla* n. sp. x 1500 ca. Die Figur ist nicht die Wiedergabe eines bestimmten Exemplares; vielmehr veranschaulicht sie den typischen Aufbau der betreffenden Form an einem konstruktiven Bild.

Description:

Die Breite übersteigt ein wenig die Höhe. Die maximale Breite ist in etwa $\frac{2}{3}$ der Höhe gelegen. Das seitliche Profil steigt im Unterteil bis zur Ausbauchung konkav empor.

Dimensionen: Höhe 21 μ ,
Breite 24,3 μ ,
Breite des Apex 17,8 μ ,
Breite der Basis 9,6 μ .

Type level:

Probably late Tertiary.

Type locality:

Rotti Island, Indonesia. Sample n° 168 of the Molengraaff's collection. « Discoasteriden-Coccolithen Kalk » of Tan Sin Hok (1927).

Depository:

Not given.

Author:

Kamptner E., 1955, p. 23; fig. 118.

Reference:

Fossile Coccolithineen-Skelettreste aus Insulinde. Eine mikropaläontologische Untersuchung. Verh. K. Nederl. Akad. Wet., Afd. Natuurk., ser. 2, vol. 50, n° 2, pp. 1-105, pls. 1-9.