


**Tremalithus pisiporus** GARDET, 1955



FIGS. 56a, b — *Tremalithus pisiporus* n. cent.,  
a) vue apicale, b) aspect en lumière polarisée.  
x 5000 env.

**Description:**

La marge semble ici constituée de plaques calcaires assez larges. La partie centrale du disque supérieur est en forme de cuvette à bords striés; un pore pisiforme en occupe le centre, parfois échancré jusqu'à la limite de la cuvette. En lumière polarisée, il donne une croix noire nette et étroite dans la partie axiale et quatre zones noires dans la partie marginale (fig. 56 b). Ces deux régions sont séparées par un anneau très brillant. Il faut en déduire que dans ce dernier la structure sphérolithique fait défaut. 7 à 12  $\mu$  de long, 3  $\mu$  de large, 1  $\mu$  de largeur du pore.

**Type level:**

Burdigalian (Prévost-Paradol, Marceau 1), Lower Vindobonian (Marceau 2), Upper Miocene (Tliouanet, Sainte Clotilde).

**Type locality:**

Prévost-Paradol, Marceau 1 et 2, Tliouanet, Sainte Clotilde (mediterranean coast of Algeria).

**Depository:**

Not given.

**Author:**

Gardet M., 1955, p. 515; pl. 6, figs. 56 a, b.

**Reference:**

Contribution a l'étude des Coccolithes des terrains néogènes de l'Algérie. Publ. Serv. Carte Géol. Algérie, Nouv. Sér., n° 5, pp. 477-550, pls. 1-11, text-fig. 1.