LEIOSPHAERIDIA taxodiformis* Giabo 1978

Giabo 1978, p. 105, pl. 37, figs 4, 5
(holotype fig. 5)

* o.c taxodiforma

Qiabo 1978 : Late Eocene - Oligocene China
He 1984b (p. 178, pl. 9, figs. 6-8) : Eocene / Early Oligocene - Late Oligocene / Early Miocene China
Qian, Chen & He 1986 (p. 26, pl. 2, figs 7-9) Paleocene - Eocene N. Jiangsu China
Zheng & He 1984 (p. 103, pl. 8, fig. 22-24) Campanian, China
Wang, Qiao, Wang & He 1997 : Barremian, Hailar Basin NE China
Ye, Zhong, Yao et al. 1996 Early Oligocene Bohaiwan Basin China
Lang, He, Wu & Yang 1999 (p. 383, pl. 1, figs. 14-17) Barremian / Aptian Eren Basin Nei Mongol N. China
Liu, Liu & Zheng 1992 (p. 99, pl. 25, fig. 5-6) : Eocene - Oligocene Xialiaohe Depression, S. Liaoning China
Meng, Liu, Sun, Gao & Qu 2005 : Paleogene Huanghua depression Hebei Province China
Cai, Zheng, Cui et al. 1998 : Early - Middle Eocene (p. 267-268, pl. 100, figs. 2-6) Central Hebei China
(cf.) Guan, Fan, Song, Zheng 1989 (p. 35, pl. 5, fig. 8) Early Miocene Bohai Sea China

LEIOSPHAERIDIA taxodiformis Jiabo 1978

杉型光面球藻 Leiosphaeridia taxodiformis Jiabo

（图版VIII，图22—24）

1978 Leiosphaeridia taxodiformis Jiabo，《渤海沿岸地区早第三纪沟鞭藻类和疑源类》，105页，图版37，图4、5。

1984 ———— ————，何承全，178页，图版9，图6—8。

壳体直径22—23μ。这个种分布于渤海沿岸地区沙河街组—东营组(晚始新世—渐新世)，广西北部湾沿岸地区邕宁群（渐新世—中新世）。