

Halopappus adriaticus SCHILLER, 1914




Fig. 29 - *Halopappus adriaticus* n.sp.

Description:

Während der XI. Najadekreuzung im November 1913 trat eine neue Art auf, die in der Form der Zelle mit der Lohmannschen Art übereinstimmt, indessen aber auf den coccolithenförmigen Basalstücken dreigliedrige Strahlen aufsitzen, von denen das erste und zweite Glied zylinderförmig und nahezu gleichlang sind, während das letzte kürzer und spitz borstenförmig erscheint (Fig. 29). Die Form benenne ich *Halopappus adriaticus* spec. nov.

Die Schalenmembran ließ Coccolithen nicht erkennen. Doch ist sie nicht strukturlos, insofern winzige Tüpfelchen, in regelmäßige Reihen geordnet, auftreten. Ob Coccolithen?

Type level:

Recent.

Type locality:

Adriatic Sea.

Depository:

Not given.

Author:

Schiller J., 1914, p. 10; pl. 2, fig. 29.

Reference:

Bericht über Ergebnisse der Nannoplanktonuntersuchungen anlässlich der Kreuzungen S.M.S. Najade in der Adria. *Int. Rev. Hydrobiol. u. Hydrogr., Biol. Suppl.* 6, vol. 4, Art. 5, pp. 1-15, 1 pl.