

**Nannotraster concavus** STRADNER, 1960




Fig. 18a-d — *Nannotraster concavus* n. sp.  
a) Facies superior; b) Facies inferior; c) Querschnitt; d) Seitenansicht, schräg.  $\times 1900$ .

**Description:**

Diagnose: Ein kleinwüchsiger *Nannotraster* mit konkav gewölbten Reliefseiten und kurzen Strahlen, die nicht in der Hauptebene, sondern in der Richtung der Sagitalachsen gegabelt sind.

Beschreibung: Dieser kleine *Nannotraster*, der in Bezug auf seine geringen Dimensionen nur von *Nannotraster staurophorus* (GARDET) MARTINI & STRADNER unterboten wird, ändert beim Wenden in flüssigem Einschlussmedium scheinbar nie seine Umrissform. Dies kommt davon, dass alle sechs Seiten dieses winzigen Kalkkörperchens eingedellt sind. Das Reliefkreuz der Facies inferior liegt also im Gegensatz zu allen bisher gefundenen *Nannotraster* in einer Mulde ebenso wie die Unterteilungslinien der Facies superior.

Grösse: 5 bis 7  $\mu$ .

**Remarks:**

*Nannotraster concavus* n. sp. hat mit *Nannotraster* (GARDET) MARTINI & STRADNER nicht nur das oberkretazische Alter gemeinsam, sondern ist auch mit letzterer Art grossenordnungsmässig vergleichbar.

**Type level:**

Obere Kreide (Senon).

**Type locality:**

Waidach, Salzburg, Österreich.

**Depository:**

Holotypus: WA 01/C; Paratypus: WA 01/F.

**Author:**

Stradner H. in Martini E. & Stradner H., 1960, p. 269; fig. 18.

**Reference:**

*Nannotetraster*, eine stratigraphisch bedeutsame neue Discoasteridengattung.  
Erdoel-Zeitschrift, Heft 8, 1960, pp. 266-270, 19 figs., 2 tbs.