

**Scyphosphaera cantharellus** KAMPTNER, 1955



FIG. 123 — *Scyphosphaera cantharellus* n. sp.  
x 1500 ca. Die Figur ist nicht die Wieder-  
gabe eines bestimmten Exemplares; vielmehr  
veranschaulicht sie den typischen Aufbau der  
betreffenden Form an einem konstruktiven Bild.

**Description:**

Gestalt kannenförmig. Von der breiten Basis aus steigt das seitliche Profil schwach konvex und konvergent auf. Unterhalb der erweiterten Öffnung liegt die halsartige engste Stelle des Lopadolithen. Die Breite des Apex ist geringer als jene der Basis.

Dimensionen: Höhe 18  $\mu$ ,  
Breite des Apex 8  $\mu$ ,  
Breite des Halses 7,3  $\mu$ ,  
Breite der Basis 10,6  $\mu$ ,  
Niveau des Halses über Basis 13,6  $\mu$ .

**Type level:**

Probably late Tertiary.

**Type locality:**

Rotti Island, Indonesia. Sample n° 168 of the Molengraaff's collection. « Discoasteriden-Coccolithen Kalk » of Tan Sin Hok (1927).

**Depository:**

Not given.

**Author:**

Kamptner E., 1955, p. 24; fig. 123.

**Reference:**

Fossile Coccolithineen-Skelettreste aus Insulinde. Eine mikropaläontologische Untersuchung. Verh. K. Nederl. Akad. Wet., Afd. Natuurk., ser. 2, vol. 50, n° 2, pp. 1-105, pls. 1-9.