


Tansinius rectangularis FILIPESCU & HANGANU, 1960



Figs. 1-8 — *Tansinius rectangularis* n. sp.

Description:

Corpuscules à bras égaux ou inégaux, allongés ou ovales, disposés normalement les uns aux autres, autour d'un centre marqué parfois par un noyau punctiforme.

Les dimensions des formes à bras égaux vont de 6 à 46 μ ; celles des formes aux bras inégaux vont, sur la verticale, de 32 à 54 μ et, sur l'horizontale, de 26 à 32 μ .

Remarks:

Les formes de l'Aquitainien de Slătioara sont de forte taille, tandis que celles que l'on trouve à la base du Sarmatien des vallées de Blahnită et d'Amaradia sont de petite taille, n'excédant pas 26 μ .

D'après les formes des bras et les dimensions, on pourrait distinguer plusieurs variétés.

Type level:

Aquitainien.

Type locality:

Schistes de Slătioara, N-O de l'Olténie, Roumanie.

Depository:

Collection du Laboratoire de Paléontologie de l'Université « C.I. Parhon » de Bucarest; le matériel est inventorié dans la collection « Olténia », échantillons n° 9, 12, 33, 58, 81, 82, avec les coupes minces respectives.

Holotype: fig. 3.

Author:

Filipescu M. and Hanganu E., 1960, p. 221, pl. 1, figs. 1-8.

Reference:

Sur les Discoastérides du Tertiaire du N-O de l'Olténie. Rev. Géol. Géogr., Acad. Rép. Pop. Roumanie, vol. 4, n° 2, pp. 217-232, 3 pls.