

**Tremalithus marginatus** KAMPTNER, 1963




FIG. 24 — *Tremalithus marginatus* nov. spec. Mikrophotogramm. Oberseite. Probe 22 (Miocän). x 3000.  
FIG. 33a, b — *Tremalithus marginatus* nov. spec. a vertikaler Längsschnitt, b Oberseite. x 3000.

**Description:**

Der Kalkkörper hat die Gestalt einer normalelliptischen Kalotte von 8,3  $\mu$  Länge und 2  $\mu$  Höhe. Die Scheibe fällt mit konvexer Flanke zur Peripherie ab. Die mittlere Durchbrechung erreicht etwa ein Drittel der Länge des Coccolithen. Der an der Konkavseite des Coccolithen vorspringende Rand der Pore reicht bis an das Niveau des Scheibenrandes. Die Scheibe trägt nahe an 50 radiäre Streifen; diese sind geradegestreckt und in der Draufsicht um einen kleinen Winkel im Uhrzeigersinn schief gestellt. In entsprechender Weise erscheint der Scheibenrand gekerbt.

**Type level:**

Miocene.

**Type locality:**

Material dredged by Schwedischen Tiefsee-Expedition (1947-48), station ST 53 (sample n° 22 in Kamptner's numeration). The dredge was operated in the point 15°34' N and 127°11' W of the Mid-Pacific Ocean, at a depth of 4725 m from the sea level. The sample was collected from 52,0 to 53,5 cm of depth from the dredge top.

**Depository:**

Not given.

**Author:**

Kamptner E., 1963, p. 184; pl. 3, fig. 24; text-fig. 33.

**Reference:**

Coccolithineen-Skelettreste aus Tiefseeablagerungen des Pazifischen Ozeans. Ann. Naturhistor. Mus. Wien, vol. 66, pp. 139-204, pls. 1-9, text-figs. 1-39.