

**Watznaueria** REINHARDT, 1964

**Description:**

Zwei elliptische Randscheiben begrenzen eine Area centralis aus mehreren Micell-Ringen. Der distale Limbus übersteht den basalen allseitig. Das Zentrum des Kalkkörpers durchbohrt eine Öffnung. Sie kann von einem basalen Septum aus tafelförmigen Micellen überspannt werden.

**Remarks:**

Unterschiede: *Tergestiella* zeigt keine zentrale Pore. *Coccolithus* SCHW. 1894 sensu Kamptner fehlen zentrale Micell-Kränze. Beide Randscheiben sind deutlich durch ein Mittelstück verbunden.

Bemerkung: Vermutlich in diese Gattung gehörende Formen beschrieben Autoren (u. a. Noël 1958) aus dem Jura und aus der Kreide und nannten sie *Coccolithus pelagicus*. *C. pelagicus* sollte aber im Sinne von Kamptner (1954) eingengt werden.

**Type species:**

*Watznaueria angustoralis* REINHARDT, 1964.

**Author:**

Reinhardt P., 1964, p. 753.

**Reference:**

Einige Kalkflagellaten-Gattungen (Coccolithophoriden, Coccolithineen) aus dem Mesozoikum Deutschlands. Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin, vol. 6, n° 10, pp. 749-759, incl. 2 pls., text-figs. 1-8.