

Watznaueria angustoralis REINHARDT, 1964




FIG. 2 — *Watznaueria angustoralis* n. sp. — Oberseite — 12000 x.
FIG. 4a, b — *Watznaueria angustoralis* — a) vertikaler Schnitt, b) Oberseite — 6000 x.

Description:

Eine Art von *Watznaueria*, welche sich durch folgende Merkmale auszeichnet: Der distale Limbus des Kalkkörpers zeigt 30—34 Elementa petala. Sie erscheinen schief gestellt. Den zentralwärts folgenden Binnenraum verschliessen zwei verhältnismässig breite Kristallkränze. In ihrem Zentrum existiert eine enge Pore, deren Durchmesser einem 1/20 bis einem 1/10 des Scheibendurchmessers gleichkommt. Grösse 6—9 μm .

Type level:

Upper Turonian.

Type locality:

Germany.

Depository:

Geologisches Institut der Bergakademie Freiberg. Holotype: 78/5 (fig. 2).

Author:

Reinhardt P., 1964, p. 753; pl. 2, fig. 2; text-fig. 4a, b.

Reference:

Einige Kalkflagellaten-Gattungen (Coccolithophoriden, Coccolithineen) aus dem Mesozoikum Deutschlands. Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin, vol. 6, n° 10, pp. 749-759, incl. 2 pls., text-figs. 1-8.